

	ANNEAU	SLEEVE	BY PASS
INDICATIONS	IMC 35-40 AVEC CO-MORBIDITÉS PAS DE GRIGNOTAGES	IMC > 40 DIABETE	IMC > 45 DIABETE ALIMENT SUCRÉE
MODE D'ACTION	EFFET RESTRICTIF, BLOCAGE, DYSPHAGIE	EFFET RESTRICTIF, EFFET SUR LA FAIM (↓ GHRELIN)	EFFET RESTRICTIF, EFFET SUR LA FAIM (↓ GHRELIN) MALABSORPTION DUMPING SYN-DROME
CONFORT ALIMENTAIRE	MAUVAIS; (VOMISSEMENTS)	BON	BON
SUIVI MÉDICAL	BEAUCOUP DE CONTRAINTES	PEU DE CONTRAINTES	TRÈS CONTRAIGNANT
RÉVERSIBILITÉ	COMPLÈTE	NON	POSSIBLE
RECU	15	5 ANS	20 ANS
DURÉE INTERVENTION	1/2 HEURE-1H	45MIN -2 H	2H-4 HEURES
COMPLICATIONS OPÉRATOIRES	TRÈS RARE	RARES HÉMORRAGIE FISTULE	RARES HÉMORRAGIE FISTULE
COMPLICATIONS TARDIVES	DILATATION POCHE SLIPPAGE MIGRATION ANNEAU	TRÈS RARES CARENCES EN VITAMINES	CARENCES EN VITAMINES HERNIE INTERNE OCCLUSION
%EWL À 1 ANS	40 %	60 %	70 %
%EWL À 5 ANS	50 %	70 %	80 %